



藥物成分

劑型

編號

Tolvaptan

口服藥

☞ 藥品商品名及含量

伸舒康錠 15 毫克/錠 (Samsca)

☞ 藥品作用

本藥可用於治療心臟衰竭及抗利尿激素分泌不當症候群 (SIADH) 引起的低血鈉症。

☞ 服用方式

1. 每天 1 次，開始每次 1 粒，若有需要時劑量可增加每天 2 粒，一天不可超過 4 粒。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏、嚴重脫水、營養不良、血鉀濃度異常、長期飲酒習慣或是有肝、腎等其他疾病病史
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是：其他心血管用藥(digoxin、verapamil 或 diltiazem 等)、抗癲癇用藥(phenytoin、carbamazepine 等)、結核用藥(rifampin)、巨環類抗生素、抗黴菌用藥、器官移植用藥(cyclosporine) 等。
3. 常見副作用為便秘、噁心、口乾、食慾變差，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診；若發生吞嚥或發音困難、四肢行動困難、視力模糊、嘔吐、腹瀉、電解質平衡異常(意識混亂、肌肉無力、心跳異常、抽搐)，血糖過高，嚴重過敏等現象，請停藥並立即就醫。
4. 懷孕分級為 C 級，女性計畫懷孕或已懷孕以及哺乳請事先告知或諮詢您的醫師。