

藥物成分

劑型

編號

Lorcaserin

口服藥

☞ 藥品商品名及含量

沛麗婷膜衣錠 10 毫克/膜衣錠 (Belviq)

☞ 藥品作用

成人身體質量指數 (BMI) 過高者於飲食和運動控制後之長期體重輔助管理。

作用機轉是透過活化位於腦部下視丘，負責控制食慾減退的受體，以增加飽足感並降低食物消耗。

☞ 服用方式

1. 建議劑量為一天兩次，早、晚各服用一錠，不可超過建議劑量。此藥品可單獨服用，亦可與食物併服。
2. 使用達 12 週時，需進行療效的評估，如果體重減少未超過 5%，則建議停止服用 BELVIQ。
3. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是充血性心衰竭、瓣膜性心臟病。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是血清素、多巴胺途徑藥物，例如：Cabergoline。
3. 常見副作用為頭痛、頭暈、乏力、噁心、口乾、便秘等，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
4. 懷孕等級 X，因減重對於孕婦沒有潛在的益處，並可能對胎兒造成傷害；動物實驗結果顯示，對懷孕後期的大鼠投與此藥，將會導致其後代持續維持較低體重直到成年。
5. 目前尚不清楚此藥是否會分泌入乳汁中，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。