



## 藥物成分

**Olmesartan/  
Amlodipine/  
Hydrochloro  
-thiazide**

## 劑型

**口服藥**

## 編號

### ☞ 藥品商品名及含量

舒脈優膜衣錠 40 毫克+5 毫克+12.5 毫克/錠 (Sevikar HCT)

### ☞ 藥品作用

本藥為複方劑型，可用於治療高血壓；本品適用於以 Olmesartan/Amlodipine/Hydrochlorothiazide 其中兩種成分合併治療，仍無法有效控制血壓的高血壓病患。

### ☞ 服用方式

1. 通常每日 1 次，每次 1 粒。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

### ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是有嚴重肝腎功能不良、蠶豆症或磺胺類藥物過敏者。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是 cyclosporine、tacrolimus 或含 aliskiren 成份之藥物。
3. 服藥期間請避免飲酒及吃葡萄柚或葡萄柚汁。
4. 常見副作用為暈眩或低血壓、周邊水腫、頭痛，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
5. 如果有下列症狀，請立刻就醫：意識混亂，心跳不規律，呼吸急促(以上可能是血鉀過高造成)、過敏反應(皮膚疹、搔癢或蕁麻疹)、水腫、排尿量改變、發燒。
6. 懷孕等級 D，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師，本藥分泌到母乳的量不明，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。