



藥物成分

劑型

編號

Lacosamide

口服藥

## ☞ 藥品商品名及含量

維帕特膜衣錠 100 毫克/錠 (Vimpat)

## ☞ 藥品作用

用於十六歲以上的癲癇患者，以單一治療或輔助治療方式，治療單純或複雜性、局部或全身性的癲癇發作。

## ☞ 服用方式

1. 通常每日 2 次，飯前飯後服用均可。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是心律不整、嚴重心臟疾病的問題。
2. 每天最大劑量不得超過 4 顆。
3. 請告訴醫師或藥師您是否正在服用其他藥物，特別是會影響心臟傳導的藥物治療(如抗心律不整或鈉離子阻斷劑)。
4. 常見副作用為頭暈、頭痛、噁心、視力模糊、平衡障礙、記憶障礙或情緒低落，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
5. 如果有下列症狀，請立刻就醫：暈厥、心跳過慢、發燒、發疹或嚴重憂鬱症。
6. 沒有孕婦使用 Lacosamide 的足夠數據，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師，本藥可能會分泌到母乳裡，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。