



藥物成分

劑型

編號

**Sacubitril/
Valsartan**

口服藥

☞ 藥品商品名及含量

健安心 100 毫克膜衣錠 49 毫克+ 51 毫克/錠 (Entresto F.C. 100MG)

健安心 200 毫克膜衣錠 97 毫克+ 103 毫克/錠 (Entresto F.C. 200MG)

☞ 藥品作用

治療慢性心臟衰竭(紐約心臟學會[NYHA]第二級至第四級)且心室射出分率降低的患者，減少心血管死亡和心臟衰竭住院風險。

☞ 服用方式

1. 起始劑量為每日兩次，每次 1 粒(100 毫克)，後依醫師指示調整劑量，達到每日兩次 200 毫克的目標維持劑量。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是肝、腎功能不良者。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是：血管張力素受體拮抗劑(ACEI or ARB)類降血壓藥物。
3. 常見副作用為低血壓、高血鉀、咳嗽、暈眩、腎功能不全，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
4. 本藥可能造成血管性水腫，若發生請立即停藥回診。如果過去使用 ACE 抑制劑或 ARB 治療曾有相關病史或是有遺傳性血管性水腫，則不得使用。
5. 懷孕等級為 X，女性如果發現懷孕，應儘速停用本品。由於接受哺乳嬰兒暴露於 Sacubitril/Valsartan 可能發生嚴重不良反應，服藥期間不建議哺乳。