



藥物成分

劑型

編號

Pirfenidone

口服藥

## ☞ 藥品商品名及含量

比樂舒活錠 200 毫克/錠 (Pirespa)

## ☞ 藥品作用

適用於治療特發性肺纖維化之患者。

## ☞ 服用方式

1. 比樂舒活錠通常初期投與劑量為 200 毫克，每天三次飯後，持續 2 週。觀察病患狀況並視情況增加 200 毫克，第 3 至 4 週，每次 400 毫克，一天三次飯後。以此方式逐步調整至第 5 週後每次投與量為 600 毫克，一天三次飯後。
2. 本藥須餐後服用。

## ☞ 注意事項

1. 常見副作用為噁心、腹瀉、嘔吐、消化不良、嗜睡、暈眩和步履不穩等，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
2. 服藥後若有無法緩解的腸胃不適、發疹或光過敏反應，請告知醫師或藥師，並依照醫師指示暫時性減低劑量或中斷給藥，以緩解症狀。服藥期間請避免過度曝曬，並注意防曬措施。
3. 用藥期間應定期監測肝功能，醫師會依照肝功能指數變化而調整劑量。
4. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是 **Fluvoxamine、Enoxacin、Ciprofloxacin**。
5. 有報告指出菸草會讓本藥的體內藥物濃度降低，因此使用本藥患者不宜抽菸。
6. 目前對胎兒的風險不明，但資料顯示動物實驗中未發現致畸胎的紀錄，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師。