

藥物成分

劑型

編號

Vildagliptin/Metformin

口服藥

## ☞ 藥品商品名及含量

高糖優美膜衣錠 50 毫克+850 毫克/錠 (GalvusMet F.C.)

## ☞ 藥品作用

本藥是複方劑型，合併兩種作用機轉之降血糖藥物，可改善第二型糖尿病人的血糖控制。

## ☞ 服用方式

1. 每日 2 次每次 1 粒，分別於早晨與晚間隨餐服用。
2. 請依照醫師指示按時服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服用一次劑量即可。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或肝腎功能不良之情形。
2. 本藥單獨服用時，一般不會引起低血糖。但與硫醯基尿素類藥物、胰島素或酒精併用時，有可能產生低血糖（心悸、冒冷汗、極度飢餓感、頭痛、昏亂），若發生低血糖症狀，請立即吃含糖飲料或食物，如果汁、糖水或方糖，如仍未見改善時應即就醫。
3. 若需要進行使用顯影劑的檢查或手術，請先告知醫師您正在使用本藥。
4. 若有發生乳酸中毒現象，如：腹部不適、呼吸急促、肌肉痛或痙攣或異常疲倦，請立即就醫。
5. 請配合飲食控制、適度運動及定期監測血糖值，應避免或限制飲酒。
6. 懷孕等級 C，女性計畫懷孕或已懷孕請先告知醫師；服藥期間不可哺餵母乳。