



藥物成分

劑型

編號

Perampanel

口服藥

## ☞ 藥品商品名及含量

癲控達膜衣錠 2 毫克/錠 (Fycompa)

## ☞ 藥品作用

適用於12歲以上成人及青少年患者局部癲癇發作、續發型全身發作、原發型全身性強直陣攣癲癇發作。

## ☞ 服用方式

1. 建議每日睡前服用一次，空腹或隨餐服用都可以。
2. 不可咀嚼、壓碎或剝半服用，應整粒吞服。
3. 於治療期間，請勿喝酒。
4. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是半乳糖不耐症、肝功能不全或藥物成癮的病史。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是口服避孕藥、Oxcarbazepine(如 Trileptal 除癲達)、Topiramate(如 Topamax 妥泰)。
3. 12 歲以下及 65 歲以上之患者，暫不建議使用本藥品。
4. 常見副作用為頭暈、嗜睡、焦慮、多疑、易怒、視覺模糊、倦怠、易跌倒，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
5. 服用本藥可能會頭暈、嗜睡，請不要駕駛、操作複雜機械或從事其他危險性活動。
6. 如果有下列症狀，請立刻就醫：出現有敵意或攻擊行為等嚴重精神及行為反應、發燒、發疹、淋巴結腫大。
7. 女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師，本藥可能會分泌到母乳裡，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。