



藥物成分

劑型

編號

Nintedanib

口服藥

## ☞ 藥品商品名及含量

抑肺纖軟膠囊 150 毫克/膠囊 (Ofev)

## ☞ 藥品作用

適用於治療特發性肺纖維化之患者。

## ☞ 服用方式

1. 建議劑量為 150 毫克，一天兩次，間隔 12 小時。應於飯後服用，並應搭配液體整顆吞服。因為味道很苦，請勿咀嚼或咬碎膠囊。
2. 肝臟酵素濃度如果上升，可能有必要調整劑量或暫時停藥。在開始使用抑肺纖治療之前及之後定期或臨床有需要時，需定期執行肝功能檢測。
3. 如果漏服抑肺纖，請忽略該劑，直接於下一次排定的時間服用下一劑。請不要補服漏掉的劑量，使用劑量請勿超過建議最大日劑量 300 毫克。

## ☞ 注意事項

1. 常見副作用為腹瀉、噁心、嘔吐和腹痛，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
2. 如果有下列症狀，請立刻就醫：出現與肝臟問題有關的任何症狀(例如：皮膚或眼白變黃、尿液暗沉(呈茶色)、胃的右側疼痛、比平常更容易出血或瘀血、全身無力、食慾不振等時。
3. 病人若出現初步的腹瀉徵象時，應適當補充水分與服用止瀉藥等以治療腹瀉，如果腹瀉持續不退，請告知醫師或藥師，並依照醫師指示暫時性減低劑量或中斷給藥，以緩解症狀。
4. 應定期檢測肝功能。不建議使用抑肺纖治療中度至重度肝功能不全之病人。輕度肝功能不全病人則以低劑量抑肺纖進行治療。
5. 懷孕期間不建議服用，懷孕女性使用抑肺纖可能對胎兒造成傷害。