



藥物成分	劑型	編號
Racecadotril	口服粉劑	

☞ 藥品商品名及含量

瀉必寧懸浮液用顆粒劑 10 毫克/包 (Hidrased)

☞ 藥品作用

輔助性急性腹瀉症狀治療。

☞ 服用方式

1. 建議劑量：每日 3 次，每次劑量以體重計算 1.5 mg/kg/每次(相當於 1 到 2 小包)。
2. 可加入食物中、或少量水(一茶匙)充分混合後立即服用。
3. 治療應持續直到有兩個正常大便的記錄。
4. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是糖尿病患者或果糖不耐症，應考慮每一小包中之蔗糖含量。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是血管收縮素轉化酶抑制劑(ACEI)例如：Captopril、Enalapril、Lisinopril、Perindopril、Ramipril。
3. 請依醫囑服用，不建議連續使用超過 5 日。
4. 常見副作用為頭痛，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
5. 如果有下列症狀，請立刻就醫：血管性水腫。
6. 本品不能使用在小於 3 個月大的嬰兒，因為沒有針對此族群的臨床研究。
7. 目前對胎兒的風險不明，資料顯示動物實驗臨床資料不足，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
8. 本藥分泌母乳量不明，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。