



藥物成分

劑型

編號

Dienogest

口服藥

☞ 藥品商品名及含量

異位寧錠 2 毫克/錠 (Visanne)

☞ 藥品作用

治療子宮內膜異位症伴隨的骨盆腔疼痛。

☞ 服用方式

- 劑量為每日 1 粒，持續不間斷，最好於每天同一時間服藥，並視需要搭配飲水。可於飯前或飯後服用。當服完一份包裝的藥物後，應開始服用下一份藥物，建議不要中斷。
- 可於月經週期的任一天開始服藥。
- 任何的荷爾蒙避孕法均必須在開始異位寧治療前停用。若有避孕需要，應使用非荷爾蒙類的避孕方法(例如：阻隔式避孕)。
- 如有漏服藥錠、嘔吐、腹瀉(發生於服藥後 3-4 小時)可能會降低此藥療效，應盡快補服，若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

- 請告訴醫師或藥師您是否有下列疾病或病症，活性期靜脈血栓栓塞疾病、目前罹患動脈及心血管疾病或有其病史(例如心肌梗塞、腦中風、缺血性心臟病)、現有或曾患嚴重肝臟疾病且肝功能的各項數值未回復至正常值、現有或曾有肝臟腫瘤、已知或疑似罹患性荷爾蒙依賴型惡性腫瘤等。
- 使用異位寧可能會加重子宮出血。如果出血大量且持續，可能會導致貧血。若發生貧血，應考慮停用異位寧。
- 懷孕女性不應接受異位寧的治療，因懷孕期間不建議治療子宮內膜異位症並於授乳期間請勿使用此藥，女性計畫懷孕或已懷孕者請告知醫師。
- 此藥品含有乳糖。患有半乳糖不耐症之患者、需無乳糖飲食患者應考慮 Visanne 中還有的量。