



藥物成分

劑型

編號

Meloxicam

口服藥

☞ 藥品商品名及含量

適穩錠 15 毫克/錠 (Loxu)

美樂骨錠 15 毫克/錠 (MEL-OD)

☞ 藥品作用

本品常用於做為類風濕性關節炎、骨關節炎及僵直性脊椎炎症狀的治療等。

☞ 服用方式

1. 對於骨關節炎般建議劑量為每日一次 7.5 毫克至 15 毫克，類風濕性關節炎及僵直性脊椎炎，一般建議劑量為每日一次 15 毫克，依疼痛程度與發炎嚴重度給藥。詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量與醫師指示，勿自行調整劑量或增加服藥次數。
2. 青少年的最高建議劑量為每公斤 0.25 毫克，尚未建立兒童使用劑量，故不建議小於 15 歲的兒童使用。
3. 錠劑可與水或其他液體及食物同時吞服。

☞ 注意事項

1. 常見副作用為噁心、嘔吐、腹瀉，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
2. 如果有下列症狀，請立刻就醫：皮膚不良/過敏反應，用藥後發生喉痛、口腔/黏膜潰爛、皮疹等症狀。
3. 用藥期間應定期監測腎功能，腎衰竭末期進行血液透析之病患，Meloxicam 之劑量不應大於 7.5 毫克，而對於輕度或中腎損害之患者不一定需要減低劑量。
4. 與口服抗凝血劑、血栓溶解劑併用可能增加出血之危險性。若併用無法避免，應密切監視抗凝血劑之效果。
5. Meloxicam 不可用於使用水楊酸或其他非類固醇抗發炎藥物(NSAIDs) 後曾出現過敏反應者。
6. 懷孕等級 C，懷孕或授乳婦女不建議使用此藥，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師。