

藥物成分

劑型

編號

Acyclovir

口服藥

☞ 藥品商品名及含量

敵庖治錠 400 毫克/錠 (Acylete)

利庖舒錠 400 毫克/錠 (Lipaoshu)

庖寧錠 200 毫克/錠 (Deherp)

剋庖錠 200 毫克/錠 (Virless)

☞ 藥品作用

減少單純性疱疹及水痘帶狀疱疹病毒引起感染復發的頻率和嚴重程度。

☞ 服用方式

1. 依據不同的病毒感染類型，有不同的使用方式；另依據腎功能情形調整劑量。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是腎臟疾病或免疫系統疾病。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是降尿酸藥物 probenecid。
3. 常見副作用為噁心、嘔吐、腹瀉、腹部疼痛，但一般並不常見，若症狀惡化且無法忍受請回診。
4. 如果有下列症狀，請立刻就醫：嚴重的皮疹。
5. 懷孕等級 B，但在人體使用的臨床經驗中仍屬有限。女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師。
6. 目前有限的數據顯示，本藥物不會由乳汁中分泌出來，但若有需要哺乳，請事先諮詢醫師/藥師。