



藥物成分

劑型

編號

Pitavastatin

口服藥

☞ 藥品商品名及含量

- 必抑脂膜衣錠 2 毫克/錠 (Pitator F.C.)
- 必脂舒膜衣錠 2 毫克/錠 (Pivas F.C.)
- 力清之口溶錠 2 毫克/錠 (Livalo O.D.)
- 平脂膜衣錠 4 毫克/錠 (Zulitor F.C.)
- 庇脂清膜衣錠 4 毫克/錠 (Pitanxo F.C.)

☞ 藥品作用

本藥可減慢體內膽固醇的生成，主要用來治療高膽固醇血症及高三酸甘油酯血症，減少發生心血管疾病或中風的機會。

☞ 服用方式

1. 通常每日 1 次，每次 0.5~1 粒。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。不慎忘記服藥請立即補服，若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是肝臟或腎臟方面的疾病。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物(包含健康食品)，特別是抗凝血劑 warfarin、cyclosporine、erythromycin、rifampin、HIV 藥物或其他降血脂藥。
3. 服藥期間請勿飲酒及大量葡萄柚汁，此兩類食品可能會加重此藥之副作用。
4. 副作用相當少見，但有可能發生：頭痛、消化不良、噁心、腹瀉，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
5. 如果有下列症狀，請立刻就醫：若出現眼睛/皮膚變黃、茶色尿液(黃疸)、右上腹疼痛、不明原因的肌肉疼痛、肌肉無力或痙攣，尤其伴有全身不適、虛弱或發燒的現象。
6. 懷孕等級 X，女性計畫懷孕或已懷孕請先告知醫師；服藥期間不可哺餵母乳，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。