



藥物成分

劑型

編號

**Trifluridine/  
Tipiracil**

口服藥

## ☞ 藥品商品名及含量

朗斯弗膜衣錠 15 及 7.065 毫克/錠 (Lonsurf)

朗斯弗膜衣錠 20 及 9.42 毫克/錠 (Lonsurf)

## ☞ 藥品作用

適用於治療轉移性大腸直腸癌之成人患者。

## ☞ 服用方式

1. 朗斯弗的初始建議劑量為每劑 35 毫克/平方公尺(體表面積)，至多每劑 80 毫克 (劑量以 Trifluridine 之含量表示)，每日兩次，早晚餐後 1 小時內服用。一個週期為 28 天，於第 1 天至第 5 天及第 8 天至第 12 天服藥，直到疾病惡化或是發生無法耐受之副作用；劑量的計算為進位至最接近之 5 的倍數。
2. 切勿為補償遺漏或延遲的劑量而服用額外的劑量。

## ☞ 注意事項

1. 常見副作用為無力、疲倦、噁心、食慾減退、腹瀉、嘔吐、腹痛、發燒、味覺障礙及脫髮等現象。
2. 如果有下列症狀，請立刻就醫：嚴重骨髓抑制造成之血球低下、腸胃道副作用、胚胎及胎兒毒性等。
3. 服用此藥的病患感染發生的更頻繁。其中最常見的分別是鼻咽炎以及泌尿道感染。
4. 應定期檢測肝腎功能。由以中度或重度肝功能不全病患。
5. 併用其他抗癌藥或放射療法時，因為可能會加重骨髓抑制和腸胃不適，病患的狀況必須密切監測。如果發現異常，須採取減少劑量或終止治療適當等措施。
6. 懷孕等級 X，應提醒具生育能力的女性在治療期間採取有效的避孕措施。男性基於基因毒性的可能，應建議以朗斯弗治療期間使用保險套，並且在其最後一劑治療之後持續至少 3 個月。本藥禁止於哺乳期間使用。