

藥物成分

劑型

編號

Methylphenidate

口服藥

☞ 藥品商品名及含量

利長能持續性藥效膠囊 20 毫克/膠囊(Ritalin LA)

專思達長效錠 18 毫克/錠(Concerta)

利他能錠 10 毫克/錠(Ritalin)

☞ 藥品作用

本藥用來治療6~60歲患有注意力不足過動症之兒童、青少年及成人病人。

☞ 服用方式

1. 每日 1 次，建議於早上服用。
2. 膠囊可整粒吞服或將膠囊打開直接吞服。膠囊及膠囊內的藥粒不可磨碎、咀嚼或切割藥粒。若有其他因素，需與食物混合，請詢問藥師。
3. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是患有心血管疾病、甲狀腺功能亢進、容易焦慮、緊張或精神激動、或是被診斷為妥瑞氏症等問題。若您正在服用其他藥物，特別是精神科方面之藥物，請務必告訴醫師或藥師。
2. 兒童每天最大劑量不得超過 2 顆、成人每天最大劑量不得超過 3 顆。未滿 6 歲或 60 歲以上患者不建議使用。
3. 常見副作用為食慾下降、神經質、失眠、噁心、口乾、鼻咽炎，若症狀嚴重且無法忍受請回診。
4. 本藥品為管制藥，非依處方之不得使用，容易發生成癮問題，請務必依指示服用，並在醫院監控下調整劑量。
5. 如果有下列症狀，請立刻就醫：血壓異常升高、抽搐、異常的情緒反應。
6. 懷孕等級 C，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師。服用本

臺北市立

服用期間最好避免以母乳哺育。有需要哺乳請事先諮詢醫師/
藥師。

TAIPEI CITY

TAIPEI CITY HOSPITAL

