



藥物成分

劑型

編號

Tetrabenazine

口服藥

☞ 藥品商品名及含量

止蹈錠 25 毫克 (Xenazine® 25mg)

☞ 藥品作用

治療亨汀頓舞蹈症之舞蹈症狀。

☞ 服用方式

1. 請遵照醫師處方服用，未經醫師同意切勿自行調整或停藥。
2. 初劑量每天早上一次，每次 12.5 毫克開始，一周後，劑量應增加為每日 25 毫克，以每日兩次 12.5 毫克方式給予。
3. 建議以每周增加日劑量 12.5 毫克方式，慢慢調整到可減輕症狀又可耐受副作用。超過 37.5 毫克則分三次服用。
4. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。
5. 藥品不受食物影響，空腹或與食物併服均可。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是肝臟疾病者。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是服用單胺氧化抑制劑(MAOIs)禁用，停用不到 14 天者禁用；服用 Reserpine 患者禁用，停藥後至少要等 20 天才能用。
3. 服藥後避免影響開車或操作機械等需注意力的活動。
4. 若有憂鬱症、自殺傾向者請告知醫師以評估使用。
5. 副作用並不常見，但還是可能發生。如：嗜睡、疲勞、失眠、靜坐不能、焦慮、憂鬱、胃腸不適、過敏等。
6. 服藥期間請避免喝酒。
7. 懷孕等級 C，不建議使用於孕婦，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師，本藥可能會分泌到母乳裡，應衡量對母親的重要性而決定是停藥或是停止哺乳。