



藥物成分

劑型

編號

Lurasidone

口服藥

## ☞ 藥品商品名及含量

樂途達錠 80 毫克/錠 (Latuda)

## ☞ 藥品作用

用來治療思覺失調症、第一型雙極性疾患之鬱症發作。

## ☞ 服用方式

1. 治療思覺失調症：每日 1 次，每次半粒。
2. 治療雙極性疾患：每日 1 次，每次四分之一粒。
3. 隨餐服用藥品，攝取熱量至少 350 大卡。
4. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是已知對 Lurasidone 或本藥品中任何成分產生過敏者。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是強力 CYP3A4 抑制劑(例：抗黴菌藥 fluconazole、抗心律不整藥 diltiazem, verapamil)或誘導劑(例：抗結核藥 fluconazole、抗癲癇藥物 phenytoin, carbamazepine)。
3. 服藥期間避免吃葡萄柚或葡萄柚汁。
4. 常見副作用為產生錐體外症候群、靜坐不能，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
5. 本藥可能會讓人眩暈/嗜睡/警覺性/協調能力降低，在還沒確定對您有任何影響前，請勿開車或操作危險機械。
6. 目前對胎兒的風險不明，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師，本藥分泌到母乳的量不明，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。