

藥物成分

劑型

編號

Mesalazine

口服藥

☞ 藥品商品名及含量

安適凡特長效腸溶膜衣錠 1200 毫克/錠 (Mezavant X.L.)

頗得斯安持續性藥效顆粒劑 2 克/包 (Pentasa PR granules)

阿腸克錠 800 毫克/錠 (Asacol Gastro-resistant Tablets)

☞ 藥品作用

屬於抗發炎藥，用於治療潰瘍性結腸炎、局部性迴腸炎所引起相關症狀，如腸道發炎、腹瀉及腹痛等。

☞ 服用方式

1. 一般建議每日口服投予，不可咬碎或咀嚼，安適凡特並與食物併用；阿腸克錠建議飯前服用；頗得斯安持續性藥效顆粒不能咀嚼，應先將小包顆粒倒在舌頭上，用水或果汁吞服。
2. 漏服藥品時，盡可能在您想起時立刻補服一個劑量，但若接近服用下個劑量的時間，那就略去錯過的劑量，並恢復到定期的用藥時間表，千萬別為了補上錯過的劑量而使用雙倍的劑量。

☞ 注意事項

1. 常見副作用為噁心、嘔吐、腹瀉、頭痛、昏睡、皮膚發疹、食慾減退等現象，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
2. 曾經對水楊酸過敏者，現在有服用抗凝血劑(warfarin)、消炎止痛藥、azathioprine、methotrexate 者，用藥之前應先告知醫師。
3. 如果有下列症狀，請立刻就醫：發生無法解釋的出血、瘀傷、紫斑、貧血、發燒或喉嚨痛。
4. 必須按時用藥才會有效，有些情況可能需要治療六星期，症狀才會緩解。
5. 從懷孕病人使用 Mesalazine 成分的有限經驗中，並沒有發現藥物誘導先天性畸形的危險性有增加的現象，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師。