

藥物成分

劑型

編號

Alogliptin/Pioglitazone

口服藥

藥品商品名及含量

歐欣尼膜衣錠 25 毫克+30 毫克/錠 (Oseni F.C.)

藥品作用

為複方降血糖藥物，具有增加胰島素敏感度和調整腸道荷爾蒙作用，達到控制血糖，可用於治療第二型糖尿病。

服用方式

1. 每日 1 次，隨餐或空腹後服用。必須整錠吞服，不可剝開。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏，特別是本品內含之成分；或是有其他疾病，如肝、腎方面疾病，特別是有心臟衰竭病史患者，本藥不建議用於有症狀的心臟衰竭患者。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是 Gemfibrozil 與 Rifampin。
3. 常見副作用為鼻咽炎、水腫、上呼吸道感染、背痛和頭痛。但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
4. 如果有下列症狀，請立刻就醫：胰臟炎、過敏反應、皮疹、蕁麻疹，Stevens-Johnson 症候群、類天疱瘡、水腫、心臟衰竭、肝功能異常和關節疼痛。
5. 由於本品於孕婦和授乳婦資料有限，懷孕等級可能為 C，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師，本藥可能會分泌到母乳中，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。