

藥物成分

劑型

編號

Ibrutinib

口服藥

## ☞ 藥品商品名及含量

億珂膠囊 140 毫克/膠囊 (Imbruvica)

## ☞ 藥品作用

1. 對先前治療無效或復發的被套細胞淋巴瘤成年病人。
2. 慢性淋巴球性白血病/小淋巴球性淋巴瘤成年病人。
3. 17p缺失性之慢性淋巴球性白血病/小淋巴球性淋巴瘤成年病人。
4. Waldenström氏巨球蛋白血症。
5. 邊緣區淋巴瘤。
6. 慢性移植體抗宿主疾病。

## ☞ 服用方式

1. 每天 1 次，需固定時間。
2. 本藥應用一整杯水送服。切勿打開、破壞或咀嚼膠囊。
3. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是肝功能不良病史。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是抗凝血藥 **warfarin**、抗血小板藥物。
3. 為避免術中出血的風險，建議病人若需進行侵入性檢查或手術前，至少先停藥三至七天。
4. 在使用本藥治療前，建議將血壓控制良好以避免高血壓的發生。
5. 常見副作用為腹瀉、疲倦、嗜中性白血球低下症、出血、上呼吸道感染、骨骼肌肉疼痛、挫傷。但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
6. 如果有下列症狀，請立刻就醫：肺炎、心房纖維顫動、高血

## 壓、續發性腫瘤、腫瘤溶解症候群。

7. 目前並無本藥用於孕婦方面的資料，因此無法確認是否存有發生重大出生缺陷及流產的藥物相關風險。建議婦女在此藥治療期間應避孕，男性也應同時避孕，並於最後一次治療後繼續避孕 1 個月。女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師。
8. 目前並無任何關於本藥或其代謝物是否會出現於人類乳汁、對餵哺母乳之嬰兒的影響、或對乳汁生成作用之影響方面的資料。有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。