



藥物成分

劑型

編號

Dapagliflozin
Metformin

口服藥

☞ 藥品商品名及含量

釋多糖持續性藥效膜衣錠10毫克+1000毫克/錠 (Xigduo XR)

☞ 藥品作用

治療第二型糖尿病(非胰島素依賴型糖尿病)

☞ 服用方式

1. 每天1次，每次1粒。必須整粒吞服，切勿切割、磨碎或嚼碎。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是中至重度腎功能異常、急慢性代謝性酸中毒(包括糖尿病酮酸中毒)者，必須小心使用並密切監測。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是topiramate 或其他碳酸酐酶抑制劑(zonisamide、acetazolamide)。
3. 常見副作用為食慾不振、低血壓、下痢、生殖器感染、鼻咽炎和尿路感染情形，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
4. 如有以下症狀，請立即就醫：
乳酸中毒、酮酸中毒(過度換氣、肌肉痛、嗜睡)、嚴重泌尿道感染(生殖器部位紅腫熱痛)、過敏反應(蕁麻疹)、急性腎臟損傷(嘔吐、過度熱曝露)。
5. 懷孕等級C，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師，懷孕期間應考慮適當的替代治療，尤其懷孕中、晚期，只有潛在獲益勝過對胎兒潛在危險時，方可在懷孕期間使用。本藥可能會分泌到母乳裡，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。