



藥物成分	劑型	編號
Vortioxetine	口服藥	

## ☞ 藥品商品名及含量

敏特思膜衣錠 5 毫克/錠 (Brintellix)

## ☞ 藥品作用

成人鬱症(major depressive disorder)

## ☞ 服用方式

1. 未滿 65 歲成人病人通常每日 1 次，每次 2 粒。
2. ≥65 歲老年患者，起始劑量務必使用每日 1 次，每次 1 粒。
3. 18 歲以下孩童及青少年之安全性與療效性未被研究，不建議使用於 18 歲以下之病人
4. Brintellix 為口服使用，單獨服用或與食物併服皆可。
5. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是癲癇病史或不穩定性癲癇狀態、躁症/輕躁症。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是單胺氧化酶抑制劑、鋰鹽、血清素作用劑、色氨酸、金絲桃(St. John's wort)、口服抗凝血劑及抗血小板藥物。
3. 須謹慎地使用於具有躁症/輕躁症病史之病人，且對於任何處於躁症階段的病人，應停用。
4. 常見副作用為噁心或頭痛、下痢、便秘、嘔吐，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
5. 動物研究已顯示生殖毒性，孕婦使用 vortioxetine 僅有有限臨床資料，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師。本藥可能會分泌到母乳裡，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。