



藥物成分

劑型

編號

**Tripotassium
Dicitrate
Bismuthate**

口服藥

☞ 藥品商品名及含量

克潰泌膜衣錠 120 毫克/錠 (KCB F.C)

☞ 藥品作用

對胃粘膜有強烈保護作用，可與潰瘍部份壞死過程中游離的胺基酸及蛋白質結合形成二度的絞合作用，產生一種堅而不溶性的保護層覆蓋在潰瘍部位，且對幽門曲狀桿菌具有殺菌的效果。

☞ 服用方式

1. 通常成人每日 2 次，每次 2 粒，飯前服用。
2. 本藥尚有其他臨床用途用法，請詢問您的醫師或藥師
3. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是曾對 tripotassium dicitrate bismuthate 或是本品之賦形劑過敏的患者。
2. 腎功能不良的患者，請勿服用本藥。
3. 服藥期間，糞便可能呈現灰色，但不影響藥效且對身體無影響。
4. 常見副作用噁心或嘔吐等腸胃症狀，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
5. 本品對孕婦或正在哺乳之女性使用之安全性尚未確立，計畫懷孕、已懷孕或有需要哺乳之女性請事先諮詢醫師/藥師。