



| 藥物成分 | 劑型 | 編號 |
|---------------|-----|----|
| Canagliflozin | 口服藥 | |

☞ 藥品商品名及含量

可拿糖膜衣錠 100 毫克/錠 (Canaglu F.C.)

☞ 藥品作用

本藥可抑制腎臟對葡萄糖的再吸收，將多餘的葡萄糖排泄至尿液中，降低血糖，可用於治療第二型糖尿病

☞ 服用方式

1. 每日一次，於早餐前或早餐後口服一粒。
2. 藥品作用不受食物影響，請依照醫師指示按時服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服用一次劑量即可。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否曾經有藥物過敏或有其他疾病，特別是重度腎功能不全或接受血液透析之末期腎衰竭病人。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是糖尿病藥物，例如：胰島素製劑、硫醯基尿素類(Sulfonylurea)或速效型促胰島素分泌藥物，可能增加低血糖的風險。
3. 藥品具利尿作用，可能導致多尿、頻尿，需適當地注意水分補充且不宜憋尿，與利尿劑併用時也需特別注意。
4. 如果有出現疑似泌尿道感染(例如：血尿、排尿疼痛、下腹或骨盆腔壓痛)，或是酮酸中毒(例如：噁心嘔吐、腹痛、全身無力、呼吸困難、意識不清)等症狀，請立刻就醫。
5. 懷孕等級 C，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師。因無法確認本藥是否會分泌到母乳裡，哺乳中婦女不建議使用。