

藥物成分

劑型

編號

Cefaclor

口服液

☞ 藥品商品名及含量

賜福樂素口服懸液用顆粒 25 毫克/毫升(Cefaclor)

☞ 藥品作用

中耳炎、呼吸道感染、泌尿道感染、皮膚組織感染

☞ 服用方式

1. 本藥品使用前須加入 **38cc** 冷開水泡製，搖勻溶解後會形成 60cc 之懸浮液。
2. 兒童一般建議劑量為每日每公斤體重 20mg，每八小時一次。
3. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 本藥品為抗生素，請遵照醫師指示服完療程，勿擅自停藥。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是抗生素類藥品。
3. 未泡製之藥品請室溫儲存(15-30°C)；泡製後，請放置冰箱冷藏(2-8°C)保存，每次服用前，請再搖勻，使用期限為 **14 天**。
4. 常見副作用為噁心、嘔吐、腹瀉，但一般都不嚴重，若出現症狀惡化且無法忍受請回診。
5. 如果有下列症狀，請立刻就醫：史蒂文生強生症候群(皮膚紅疹或嘴破，且合併類流感的症狀，像是發燒、顫抖、肌痛或噁心嘔吐等)。
6. 懷孕分級 B，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師，本藥可能會分泌到母乳裡，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。