



藥物成分	劑型	編號
Umeclidinium	乾粉吸入劑	

☞ 藥品商品名及含量

英克賜易利達 55 mcg 乾粉吸入劑 (Incruse Ellipta)

☞ 藥品作用

本要主要用於慢性阻塞性肺病患者之氣道阻塞症狀的維持治療。

☞ 使用方式

1. 每日吸入一次，如下步驟：

勿遮蔽氣孔

<p>1. 滑開綠色外蓋至聽到【卡搭】聲，即完成一次劑量之填充。</p>	<p>2. 先向旁邊盡量吐氣。(不可對吸嘴吐氣) 3. 嘴巴含住吸口，以長而穩定的方式深吸一口氣 (深吸目的是要讓藥粉進入肺部深處，達到良好的治療效果)。</p>	
<p>4. 移開吸入器，閉住氣至少 3-4 秒鐘。</p>	<p>5. 慢慢吐氣。</p>	<p>6. 將綠色外蓋向上滑回原位即可。</p>

☞ 注意事項

1. 請於需用藥時再打開蓋子。
2. 每日建議在相同時間使用較佳。
3. 每 24 小時不可使用超過一次。請依照醫師指示用藥，不可自行調整劑量或增加用藥次數。若不慎忘記用藥，請立即補用，但若已接近下一次用藥時間，在下次用藥時間用藥即可，不可為了補服而使用雙倍劑量。
4. 本品禁用於有嚴重乳蛋白過敏問題的患者，或已證實對成分或任何賦形劑過敏的患者。
5. 不適用於病情正在快速惡化或發生可能危及生命之發作事件的阻塞性肺病患者。
6. 如果使用後症狀不見緩解，或使用短效型緩解劑頻率變高，請盡速就醫。
7. 常見副作用為上呼吸道感染、鼻炎、咳嗽、尿滯留、窄角性青光眼等，一般症狀輕微，若症狀惡化且無法忍受請回診。
8. 如果有下列症狀，請立刻就醫：心跳過快、心律不整。
9. 懷孕等級 C，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師，本藥可能分泌到母乳裡，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。

☞ 清潔方式

以乾面紙擦拭即可，本藥不可碰觸水，不需要常態性的清潔。

☞ 儲存方式

室溫陰涼處儲存，自藥盒取出可存放 1 個月

☞ 如何觀測剩餘藥量

1. 吸入劑瓶身有一個剩餘劑量的視窗，共含有 30 劑。
2. 當您的吸入器只剩下小於 10 劑時，計數器左邊會呈現紅色提醒您需要準備新的吸入器。

