

藥物成分

劑型

編號

**Beclomethasone/
Formoterol**

**乾粉
吸入劑**


☞ 藥品商品名及含量

肺舒坦耐舒樂乾粉吸入劑 100 及 6 微克/每定量
(Foster NEXThaler)

☞ 藥品作用


能抑制發炎並擴張氣管，主要用於氣喘及慢性阻塞性肺部疾病的常規治療。

☞ 使用方式



目視檢查：

1. 檢查剩下的劑量數：「1」到「120」之間的任何數字都代表仍有藥劑。(如果劑量計數器窗口顯示為「0」，代表已無任何藥劑—請丟棄並尋求新品。)
2. 使用前請先確認保護蓋完全關上。



打開：

1. 穩穩地拿起吸入器，使其呈直立狀態。
 2. 打開保護蓋至全開。
 3. 吸氣之前，在仍感到舒服的範圍內盡量吐氣。
- ◎請勿對著吸入器吐氣。



吸氣：

吸氣時應盡可能在站立時或坐姿時保持直立的姿勢。

1. 舉起吸入器靠向您的嘴巴，以嘴唇含住吸入口。
 - ◎拿著吸入器時請勿遮住通氣孔。
 - ◎請勿從通氣孔吸氣。
2. 從嘴巴迅速深吸一口氣。
 - ◎吸入藥劑時您可能察覺到有味道。
 - ◎吸入藥劑時您可能聽到或感受到喀答聲。
 - ◎請勿從鼻子吸氣。


臺北市立聯合醫院



◎吸氣過程中請勿將吸入器從嘴唇移開。

3. 將吸入器從嘴巴移開。
4. 屏氣 5 到 10 秒，或您感到舒適的最長時間。
5. 緩慢吐氣。

◎請勿對著吸入器吐氣。



關上：

1. 將吸入器擺回直立姿勢，並將保護蓋完全蓋上。
2. 確認劑量計數器的數字已減少 1 單位。

⊗ 注意事項

1. 成人的劑量建議：一天 2 次，每次吸入 1 或 2 劑。每日劑量上限為 1 天 4 劑。
2. 要停止治療時，建議以逐漸降低劑量的方式停藥，不可突然中斷治療。
3. 使用完後請記得漱口，避免鵝口瘡的發生。
4. 使用時，只有當保護蓋完全打開時方可送出藥物供吸入。依序開啟保護蓋、吸入藥物、再蓋上保護蓋的動作可驅動劑量計數器之機制。於任何情況下均應完全蓋緊保護蓋。如果並未經由吸入器吸入藥物，則蓋上保護蓋時，外殼上窗口所顯示的劑量數不會減少。
5. 首次打開保護袋後，藥品應於 6 個月內用畢。請勿保存於 25°C 以上的環境。
6. 目前沒有懷孕或哺乳相關的安全性資料，故除非經過醫師評估利弊，否則並不建議使用。

⊗ 清潔方式

一般情況下無需清潔您的吸入器。如有必要，您可在使用後以乾布或紙巾清潔吸入器。請勿以水或其他液體清潔吸入器，務必保持乾燥。

⊗ 如何觀測剩餘藥量

吸入器附有劑量計數器窗口，若吸入器為全新，劑量計數器窗口上可以看到「120」。每釋出一個藥物劑量，計數器便會往前倒數，直至零為止。若劑量計數器窗口顯示的數字為「0」，請丟棄並更換吸入器。