

藥物成分

**Budesonide/
Formoterol**

劑型

**噴霧吸
入劑**

編號

☞ 藥品商品名及含量

吸必擴氣化噴霧劑 160 及 4.5 微克/每定量
(Symbicort Rapihaler)

☞ 藥品作用


能抑制發炎並擴張氣管，主要用於氣喘及慢性阻塞性肺部疾病的常規治療。

☞ 使用方式

第一次使用、或已有一週以上未使用，或曾掉落過，使用前請輕輕搖晃吸入器 5 秒，並直立對空按壓 1 次，之後再輕輕搖晃吸入器 5 秒，並再次對空按壓 1 次準備使用。
之後每次劑量按照下列方式使用：



1. 每次使用前輕輕搖晃吸入器 5 秒，再移開吸嘴蓋
2. 將拇指放在吸入器底部，食指放在頂部，使吸入器直立在嘴巴前方。
3. 朝向旁邊深深吐完肺中氣體後，把整個吸嘴輕輕放進嘴裡牙齒之間，閉上嘴唇包覆吸嘴。
4. 經由嘴巴緩慢地用力深深吸氣，同時以食指確實按壓吸入器，釋出一個定劑量
5. 繼續吸氣並閉氣約 10 秒，在吐氣前，放開在吸入器頂部的食指，保持吸入器的直立，然後把吸入器從口中移出。
(如果按照醫師指示，要吸入另一個劑量，則輕輕搖動吸入器 5 秒，重覆步驟 2-5。)



6. 蓋上吸嘴蓋，防止灰塵及其他碎片進入。
7. 以水漱口，去除多餘的藥物

注意事項

1. 作為氣喘及慢性阻塞性肺部疾病的常規治療，通常一日 1~2 次，每次 1 或 2 個劑量，某些特定情況可到每次 4 個劑量。
2. 要停止治療時，建議以逐漸降低劑量的方式停藥，而且不可突然停藥。
3. 拆開箔袋之後，保存期限是 3 個月。
4. 使用完後請記得漱口，避免鵝口瘡的發生。
5. 目前沒有懷孕或哺乳相關的安全性資料，故除非經過醫師評估利弊，否則並不建議使用。

清潔方式

建議至少每週清潔一次。取下吸嘴蓋後，以乾淨的乾布擦拭吸嘴的內側和外側即可，請勿將吸入器放在水中。

如何觀測剩餘藥量

吸入器頂部附有計數器，其上的箭頭可標示出吸入器中剩下多少劑量，每釋出一個藥物劑量，計數器便會往前倒數，直至零為止。當計數器上的箭頭進入黃色區域，表示剩下約 20 個劑量，請回診或準備新的吸入劑。當計數器達到 0 時，請更換吸入劑使用。



劑量
標示

