



藥物成分

劑型

編號

Mesalazine

栓劑

☞ 藥品商品名及含量

頗得斯安栓劑 1 公克/粒 (Pentasa Suppositories)

☞ 藥品作用

屬於抗發炎藥，用於治療潰瘍性結腸炎、局部性迴腸炎所引起之相關症狀，如腸道發炎、腹瀉及腹痛等。

☞ 使用方式

1. 依據病人狀況給予個別的劑量。頗得斯安栓劑一天 1-2 次，每次 1 粒，亦可分次給予。
2. 兒童之使用經驗有限，故不建議使用。
3. 建議使用前請先如廁，先沿撕裂處打開鋁箔袋，將頗得斯安栓劑塞入直腸直到感覺有阻力為止。為幫助更容易塞入腸，可以先用水或保濕霜濕潤。
4. 如果頗得斯安劑在塞入 10 分鐘內排出，可以投予另 1 粒。

☞ 注意事項

1. 常見副作用為腹瀉、噁心、嘔吐等現象，但一般都不嚴重，塞入本劑後，可能對直腸會產生些許局部反應：如搔癢、直腸不舒服及壓迫感。若症狀惡化且無法忍受請回診。
2. 曾經對水楊酸過敏者，應先告知醫師。
3. 如果有下列症狀，請立刻就醫：發生急性不耐症如腹絞痛、急性腹痛、發燒、劇烈頭痛、皮疹、過敏反應及藥物熱。
4. 建議所有病人在開始進入療程前都先評估腎功能，在治療期間須定期評估腎功能。
5. 頗得斯安栓劑治療效果是取決於藥物與腸黏膜病灶的局部接觸。頗得斯安栓劑的設計可提高腸道末端的藥品濃度和降低全身性吸收，並可覆蓋全直腸。
6. 懷孕及授乳婦女使用頗得斯安栓劑時應小心，而且只有在醫師認為潛在的好處超過可能的傷害狀況下才使用頗得斯安栓劑。腸炎疾病本身可能增加懷孕時的風險，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師。