



藥物成分	劑型	編號
Buprenorphine	貼片	

☞ 藥品商品名及含量

全克痛穿皮貼片劑 35 微克/小時/片 (Transtec Transdermal Patch)

☞ 藥品作用

使用於需要長期全天性使用類鴉片鎮痛劑之中度至重度癌症疼痛，以及對非類鴉片鎮痛劑無效之重度疼痛。並僅限使用於曾經使用過類鴉片藥物的病患。

☞ 服用方式

1. 貼片劑請勿裁切。應黏貼在無刺激不適之乾淨、無毛髮、表面平坦的皮膚，不可黏貼在有大大傷疤的皮膚部位。
2. 上半身較佳的黏貼位置為上背部或胸部鎖骨下。
3. 清潔請以清水清洗，勿使用肥皂或任何其他清潔劑。
4. 黏貼前皮膚須完全乾燥，貼片劑從包裝取出後須立即黏貼。
5. 撕除離型紙後，應以手掌將穿皮貼片劑緊壓在黏貼部位大約 30 秒。
6. 貼片劑不會受泡澡、淋浴或游泳影響，但不可暴露於高熱（例如蒸汽浴、紅外線照射）。
7. 貼片劑應持續黏貼最多 4 天。在移除前一片穿皮貼片劑後，新的貼片劑應黏貼在不同的皮膚部位；相同的皮膚位置至少需相隔 3 週才可再黏貼新的穿皮貼片劑。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是對此藥物過敏者。
2. 和酒精或其他中樞神經抑制劑(如鎮靜劑、抗焦慮劑、安眠藥、抗精神病藥、其他類鴉片藥物)同時使用時，可能會增強此類藥物的作用。
3. 勿併用酒精性飲料。
4. 避免開車或操作機械。
5. 使用後請以清水洗手。
6. 常見副作用為噁心、紅斑、搔癢，但一般都不嚴重，若症

狀惡化且無法忍受請回診。

7. 18歲以下兒童之安全性及有效性尚未建立，不建議使用。
8. 如果有下列症狀，請立刻就醫：過敏反應、呼吸困難。
9. 懷孕期間禁止使用貼片劑；本藥可能會分泌到母乳，使用貼片劑期間不建議哺乳。