



藥物成分	劑型	編號
Bacitracin Neomycin Polymyxin B	外用藥膏	

## ☞ 藥品商品名及含量

使皮新軟膏 400 單位及 3.5 毫克及 5000 單位/克 (Spersin)

## ☞ 藥品作用

急救、預防及減緩皮膚刀傷、刮傷、燙傷之感染。

## ☞ 使用方式

1. 通常每日 2~4 次，適量塗於患部。
2. 請依照醫師或藥師指示使用，不可自行增加使用次數。若不慎忘記使用，請立即使用，但若已接近下一次用藥時間，在下次用藥時間塗藥即可，不可為了補用而使用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有抗生素藥物過敏或是有其他疾病，特別是對抗生素過敏者。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是抗生素類藥品。
3. 本藥品限外用，請勿口服或使用於眼睛內。
4. 常見副作用為皮膚過敏反應，包含紅腫、搔癢等，但僅有少數人會發生且一般並不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
5. 如果有下列症狀，請立刻就醫：症狀未改善且發現有更深層皮膚組織感染。
6. 懷孕等級 D，在人體研究試驗中該藥物對胚胎有不良影響之可能，但此藥能帶來之效益若遠超過其它藥物，即使在其危險性的存在下，仍可接受此藥物用於懷孕婦女上。女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師，本藥可能會分泌到母乳裡，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。