



<b>劑型</b>	<b>編號</b>
<b>眼科用藥</b>	

**本院商品作用及副作用**

藥物種類	臨床作用	主要副作用	本院常見藥品	
人工淚液類	乾眼症	些微刺激感	Duratears Liposic、Ginsol Tears Naturale	
抗過敏類	緩解過敏	些微刺痛/灼熱感	Allergopos、Alminto Kinzaten、Zaditen	
疲勞治療類	改善疲勞	少見	O.N.S.D.	
降眼壓劑	治療青光眼	眼睛紅/腫，睫毛變黑，可能有刺激感	Alphagan P Azarga Azopt Cosopt Duotrav	Mikelan LA Taflotan Timoptol Travatan Xalatan
散瞳劑	眼科檢查、控制近視	視力模糊、怕光	Atropine、Antol Mydriacyl、Mydrin-P Tropine	
類固醇	消炎	可能會讓眼壓升高	Betason-N Econopred	Fluorone、 Flucason Rinderon A Fusone
血管收縮劑	可使充血的結膜變白	太頻繁使用後停藥，可能使充血反彈性加劇	Allergopos、Alminto Safin	
抗生素類	治療/預防眼睛感染	些微刺痛感、濫用可能造成抗藥性	Cravit Kingmin Safin Tobrex	Betason-N Gentamycin Rinderon A 非抗生素 Tetracycline
抗白內障類	減緩白內障加重	少見，過敏	Kary uni	

消炎止痛類 消炎止痛

短暫灼熱或刺痛感 Volen

## ☞ 使用方式

使用眼藥前都請先用肥皂洗淨雙手並摘除隱形眼鏡，過程中請注意眼睛或其它東西不可接觸到滴管頭或瓶口，避免汙染眼藥

### 眼藥水/眼用凝膠使用步驟




1. 頭後仰或平躺，拉開下眼瞼

2. 眼睛朝上看，藥水瓶口朝眼瞼附近的眼白處點一滴眼藥水

3. 輕閉雙眼 2-5 分鐘並按壓眼內角鼻淚管處

### 眼藥膏使用步驟

1. 頭後仰或平躺，拉開下眼瞼
2. 眼睛朝上看，將藥膏塗抹在眼瞼上約 1/3 長度左右
3. 藥物瓶口不可接觸眼睛，若擔心不易控制，也可先將藥膏塗在乾淨消毒的棉花棒再上藥
4. 輕閉雙眼 2-5 分鐘



## ☞ 注意事項

1. 若要點 2、3 種眼藥水，每種需間隔 5 至 10 分鐘；同時點眼藥水及眼藥膏時，應先點眼藥水，並最少 5 分鐘後再點眼藥膏。
2. 平時請放置在陰涼避光處(25°C 以下)保存，某些眼藥需冷藏 (2°C 至 8°C) 保存，請注意藥袋警語。
3. 眼藥開封後 1 個月未使用完畢即應丟棄。
4. 若顏色有變化、顆粒/混濁沉澱物，或出現異味，不可再使用。
5. 使用隱形眼鏡時，勿點眼藥水，除非經醫師允許。
6. 眼藥水/膏可在醫師指示下皮膚外用，但外用後不可再擦回眼睛。