



藥物成分

劑型

編號

Aripiprazole

針劑

☞ 藥品商品名及含量

安立復美達持續性藥效肌肉注射用懸浮劑 400 毫克
(Abilify Maintena)

☞ 藥品作用

治療成人的思覺失調症。成人的第一型雙極性疾患維持治療之單一療法。

☞ 使用方式

1. 起始和維持劑量為每個月400毫克(至少在前一次注射的26天後投與下一個劑量，如投予劑量發生不良反應，考慮減低至300毫克)。
2. 對從未使用過aripiprazole的患者，建議在開始使用Abilify Maintena治療之前須先確立其對口服aripiprazole之耐受性。由於口服aripiprazole之半衰期特性，需要至少兩週時間，全面評估aripiprazole的耐受性。
3. 在Abilify Maintena第一個劑量注射後，須接受連續14天的口服aripiprazole(10-20毫克)，以確保初始治療期間aripiprazole達到治療濃度。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師，您是否對此或其他藥物有過敏反應。Abilify Maintena 禁用在已知對 aripiprazole 過敏者(包括從搔癢/蕁麻疹至過敏性反應)。
2. 請告訴醫師或藥師，您目前正在服用的藥物(包含非處方藥)或過去兩星期所服用的藥物，特別是 CYP3A4 誘導劑(如 carbamazepine)，CYP3A4 抑制劑(如 ketoconazole 或 clarithromycin)，CYP2D6 抑制作用的藥物(如 quinidine、fluoxetine 或 paroxetine)。
3. 請告訴醫師或藥師，您目前或曾有過的疾病，如：心血管疾病(心肌梗塞、缺血性心臟病、心臟衰竭或傳導異常之病史)，腦血管疾病，癲癇，糖尿病或失智症等。

臺北市立

4. 常見副作用為注射部位反應、靜坐不能、便秘，若症狀惡化且無法忍受請回診。
5. 儲存於 30°C 以下，不要冷凍，以原包裝儲存，避免光線照射。
6. 女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師。服用本藥期間最好避免以母乳哺育。有需要哺育請事先諮詢醫師/藥師。