



藥物成分

劑型

編號

Paliperidone

針劑

## ☞ 藥品商品名及含量

善妥達持續性藥效肌肉注射懸浮劑 525 毫克/劑  
(Invega Trinza)

善思達持續性藥效肌肉注射懸浮劑 150 毫克/劑  
(Invega Sustenna)

善思達持續性藥效肌肉注射懸浮劑 100 毫克/劑  
(Invega Sustenna)

## ☞ 藥品作用

是一種 3 個月型注射劑，用於已使用 Invega Trinza (1 個月型 paliperidone palmitate 持續性藥效注射用懸浮液) 充分治療至少 4 個月後之思覺失調症患者。

## ☞ 服用方式

1. 應每 3 個月注射 1 次，可於 3 個月時間點的前後 2 週內進行注射。
2. 途徑：僅供肌肉(手臂或臀部)注射使用，應小心避免不慎注入血管，切勿透過任何其他途徑給藥。
3. 應一次注射全部劑量；切勿將一劑分成數次施打。
4. 針頭：僅可使用 Invega Trinza 注射套組中所提供的薄壁針頭。切勿使用 1 個月一次 paliperidone palmitate 持續性藥效注射用懸浮劑注射套組中的針頭或其他市售針頭。
5. 如果距離上次注射 Invega Trinza 的時間已超過 3 個半月(但不到 4 個月)，應儘快投予先前所使用的 Invega Trinza 劑量，然後在這次投藥後繼續每 3 個月注射一次。距離上次注射 Invega Trinza 的時間已達 4 個月至 9 個月(含)，切勿投予下一劑 Invega Trinza，應重新開始療程。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是 paliperidone 或 risperidone；疾病如失智症等。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是降血壓藥物、carbamazepine、rifampin、聖約翰草、levodopa 及其

他多巴胺作用劑等。

3. 使用善妥達期間，請避免喝酒。

4. 常見副作用為注射部位反應、體重增加、頭痛、上呼吸道感染、靜坐不能、以及帕金森氏症等。但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請立刻就醫。

5. 在第三孕期於母體內曾接觸到抗精神病藥物的新生兒可能會出現一些相關症狀，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師，本藥可能會分泌到母乳裡，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。