



藥物成分	劑型	櫃號
Triamcinolone Acetonide	外用藥膏	

☞ 藥品商品名及含量

寧康口內膠 1 毫克/克 (Nincort oral gel)

☞ 藥品作用

治療口腔黏膜、舌、齒肉及嘴角之潰瘍、發炎。

☞ 使用方式

1. 通常一日一次，盡量在睡前或餐後使用。如症狀較嚴重，可每日兩至三次。
2. 適量塗敷於患處，使用後暫時避免飲食。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是結核病、胃潰瘍或糖尿病。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是類固醇類藥物。
3. 常見副作用為使用後局部灼熱感、搔癢刺激，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
4. 如果有下列症狀：出現局部化膿性感染，或是使用七天後仍沒改善，請立刻就醫。
5. 懷孕等級 C，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師，本藥分泌到母乳的量不明，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。
6. 本藥接觸水份會迅速硬化形成保護膜，故使用前須注意：
 - a. 請先清洗手部並確定雙手擦乾。
 - b. 盡可能以無菌棉花棒沾取藥物塗抹傷口，避免管口與唾液及其他水份接觸。
 - c. 開封後立即使用，勿與空氣暴露過久，使用後旋緊蓋子，並以乾淨紙張擦拭管口周遭。
 - d. 若擠不出來，用蓋子刺穿器將管口刺深一點，使開口擴大即可擠出。