



藥物成分	劑型	櫃號
Carvedilol	口服藥	

## ☞ 藥品商品名及含量

- 心全錠 6.25 毫克/錠 (Syntrend)
- 心全錠 25 毫克/錠 (Syntrend)
- 卡菲蒂羅錠 6.25 毫克/錠 (Carvedilol)
- 卡菲蒂羅錠 25 毫克/錠 (Carvedilol)
- 慢又低膜衣錠 25 毫克/錠 (Longcardio)
- 卡心平錠 6.25 毫克/錠 (Carlatrend)
- 壓落保錠 25 毫克 "中化"/錠 (Carvedilol)
- 達利全錠 6.25 公絲 "羅氏"/錠 (Dilatrend)

## ☞ 藥品作用

含  $\alpha_1$ 、 $\beta_1$ 、 $\beta_2$  受體阻斷性質的腎上腺素接受器阻斷劑，可治療高血壓、冠狀心臟疾病、慢性心衰竭。

## ☞ 服用方式

1. 通常劑量 3.125 毫克-50 毫克，每日 2 次，服用劑量需依照個別病患適應症做調整。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是不穩定或失去代償性心衰竭、肝功能不良、嚴重房室傳導障礙、心跳過慢(每分鐘<50 下)、嚴重低血壓(收縮壓<85mmHg)、心因性休克、支氣管痙攣或氣喘病史。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是毛地黃(digoxin)、抗心律不整藥(如：amiodarone)、鈣離子阻斷劑(如：verapamil、diltiazem)、抗排斥藥(如：cyclosporin) 抗結核藥(rifampin)、H2 阻斷劑(cimetidine)及降血糖藥品。
3. 因為這個藥會讓心跳變慢，糖尿病病友服用後可能使低血

糖副作用發生時的心跳過速不明顯，請病友注意。

4. 本藥用來保護心臟時需長期定時服用，若已長期服用未經醫師許可請勿任意突然停藥，可能會導致病情惡化。
5. 常見副作用為四肢冰冷、疲倦無力、頭暈，偶爾可能會引起皮膚紅疹、腸胃不適，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
6. 如果有下列症狀，請立刻就醫：呼吸困難、心跳不規則且變慢、不尋常出血。
7. 懷孕等級 C，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師，本藥可能會分泌到母乳裡，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。