



藥物成分	劑型	櫃號
Febuxostat	口服藥	

☞ 藥品商品名及含量

- 福避痛膜衣錠 80 毫克/錠 (Feburic)
- 伏痛好膜衣錠 80 毫克/錠 (Forliton)
- 達理痛膜衣錠 80 毫克/錠 (Febuton)

☞ 藥品作用

治療慢性痛風病人的高尿酸血症。不建議用於無症狀的高尿酸血症者。用於因血液腫瘤接受化療，發生腫瘤溶解症後群 (Tumor Lysis Syndrome) 的中度至高度風險成年病人，以預防和治療高尿酸血症。

☞ 服用方式

1. 通常每日 1 次，每次 1 粒。
2. 服用 febuxostat 無需顧慮食物與制酸劑的使用。
3. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 對 febuxostat 及本品之賦形劑過敏者禁用。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，正在使用 azathioprine 或 mercaptopurine 的患者禁用 febuxostat。
3. 開始使用 febuxostat 後，經常觀察到痛風發作增加，這是由於血清尿酸濃度降低，尿酸鹽從組織沉積轉移所致。為了防止痛風發作，建議開始使用 febuxostat 時，同時給予非類固醇抗發炎藥 (NSAID) 或秋水仙素的預防性治療
4. 常見副作用為噁心、關節痛，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
5. 若有心血管事件、肝功能異常、皮疹，請回診評估診治。
6. 本品使用在孕婦的資料數據有限。懷孕期間只有當潛在效益超過對胎兒的潛在風險時方可使用 febuxostat，女性計

臺北市立



畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。沒有關於 febuxostat 存在於人類乳汁、對乳兒的影響、或影響乳汁製造的數據。