



藥物成分	劑型	櫃號
Dapoxetine	口服藥	

☞ 藥品商品名及含量

Dapoxetine 錠 30 毫克/錠 (Priligy 30mg tab 必利勁膜衣錠 30 毫克)

Dapoxetine 錠 30 毫克/錠 (利久樂膜衣錠 30 毫克)

☞ 藥品作用

18-64 歲且符合下列所有條件的早發性射精男性：

1. 陰道內射精潛伏時間短於兩分鐘。
2. 難以控制射精，在性行為插入之前、當時或不久後經過輕微刺激，發生持續或復發性射精。
3. 因為早發性射精而導致病人明顯沮喪本藥用來治療早發性射精。

☞ 服用方式

1. 30 mg 在性行為之前約 1 至 3 小時視需要使用，建議服用頻率最多一天一次。
2. 服用前 24 小時請勿服用葡萄柚汁。
3. 錠劑應整顆吞服以防苦味，且建議至少併服一杯水。
4. 可單獨使用或與食物併用。

☞ 注意事項

1. 常見副作用為噁心、頭暈、失眠、疲倦、姿勢性低血壓、勃起功能障礙。
2. 請謹慎服用，此藥物可能會引起暈眩或頭昏眼花，若症狀惡化且無法忍受請停藥並回診。
3. 服用後，請避免駕駛或操作具危險性的器械；並且避免與酒精類飲料共用。服用後，請盡量待在舒適安全的處所。
4. 女性不適用。
5. 重度腎功能異常、中/重度肝功能異常不建議使用。
6. 病患應於服用 4 周或 6 次劑量之後經由醫師評估效益與安全性，以決定是否續用。