



藥物成分

劑型

櫃號

Pinaverium

口服藥

藥品商品名及含量

免腸躁膜衣錠 50 毫克/錠 (DeliBs)
得舒特 50 毫克/錠 (Dicetel)

藥品作用

腸胃道平滑肌鬆弛劑。治療胃潰瘍、十二指腸潰瘍、過敏性結腸、結腸炎、膽管運動困難。

服用方式

1. 通常每日 3 次，每次 1 粒。
2. 此藥對粘膜有刺激性，建議以一杯水在吃飯時吞服，不可口含也不可咬碎，且不要在躺臥或臨睡前吞嚥。
3. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是有半乳糖不耐症、Lapp 乳糖酵素缺乏症或葡萄糖-半乳糖吸收不良。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物。
3. 常見副作用為：腹痛、腹瀉、噁心、嘔吐、吞嚥困難，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
4. 如果有下列症狀，請立刻就醫：皮疹、蕁麻疹、紅斑、嚴重腹痛、腹瀉。
5. 懷孕婦女其安全性尚未確立，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師，本藥可能會分泌到母乳裡，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。