



藥物成分	劑型	櫃號
<b>Nirmatrelvir/ Ritonavir</b>	<b>口服藥</b>	
版本：TPE202309／櫃號：2023-808		

## ☞ 藥品商品名及含量

**Paxlovid 為 nirmatrelvir 150 mg 2 錠與 ritonavir 100 mg 1 錠的組合包裝。**



早上吃

晚上吃

## ☞ 藥品作用

適用於發病5天內、具有重症風險因子之成人與兒童病人(12歲以上且體重至少 40 公斤)的輕度至中度新型冠狀病毒疾病(COVID-19)確診者。

## ☞ 服用方式

1. Paxlovid 是 nirmatrelvir 與 ritonavir 2 種藥物組成，每天口服 2 次(早上和晚上)，每次劑量是 2 顆粉紅色和 1 顆白色錠劑，需要同時服用 3 顆錠劑且持續 5 天。
2. 腎功能不佳的患者，醫師會為您減量使用，每次劑量是 1 顆粉紅色和 1 顆白色錠劑，需要同時服用 2 顆錠劑且持續 5 天。
3. 可與食物併服或不併服。需要整顆吞服，**不要咀嚼、分開或壓碎錠劑**。未經醫師指示，請勿擅自更改劑量或停藥。

## ☞ 注意事項

1. 若忘記服藥在平常服用的 8 小時內服一劑，請盡快服用。如果超過 8 小時才想起請略過，從下個劑量繼續按時使

用，不可服用雙倍劑量。

2. 如果您正在服用含 ritonavir 或 cobicistat 的藥物來治療 C 型肝炎或人類免疫缺陷病毒感染，應按照指示繼續接受治療。
3. 對 Paxlovid 中的任何成分過敏請勿服用。
4. Paxlovid 有可能造成急性和其他過敏反應，若有發生皮疹、蕁麻疹或其他皮膚反應、吞嚥或呼吸困難、顯示血管性水腫的任何腫脹(例如，嘴唇、舌頭、臉部腫脹、喉嚨發緊、聲音嘶啞)或過敏反應的其他症狀，請盡快告知您的醫師。
5. 因本藥與其他藥物有許多交互作用，會增加或減少多種其他藥物的濃度，請務必主動告訴您的醫療團隊，提供者您正在使用的所有藥物。若於治療期間需使用其他藥物，請主動告知醫師或諮詢藥師。
6. 可能的藥物副作用：食慾不振、皮膚和眼白變黃(黃疸)、深色尿液、淺色糞便和皮膚搔癢，胃部(腹部)疼痛。
7. 其他可能副作用：味覺改變(苦味)、腹瀉、血壓升高、肌肉疼痛。
8. 為確保療效，若症狀輕微請勿停藥。

## 其他注意事項

1. 現有的 Paxlovid 臨床資料相當有限，可能會發生先前使用 Paxlovid 時未曾通報的嚴重與非預期的不良事件，如果有任何困擾您或持續未緩解的副作用，請告知醫師或諮詢藥師。
2. 目前尚無 Paxlovid 用於孕婦之臨床資料，若臨床醫師經評估個別感染孕婦後研判使用之效益大於風險，經充分告知且病人同意下可使用。
3. 本藥尚未取得我國藥物上市許可，係因應緊急公共衛生需要，專案核予 EUA 以提供病人使用，故因使用此藥物後發生不良反應導致死亡、障礙或嚴重疾病時，不適用藥害救濟。