



藥物成分	劑型	櫃號
<b>Naltrexone Hydrochloride</b>	<b>口服藥</b>	
版本：TPE202309／檔號：2023-675		

## ☞ 藥品商品名及含量

**納霍利膜衣錠 50 毫克/錠 (Notholic Film-coated Tablets)**

## ☞ 藥品作用

1. 酒精依賴：可降低酒精依賴患者之復用。
2. 鴉片類藥物依賴：可預防鴉片類藥物依賴患者之復用。
3. 本藥尚有其他臨床用途，請詢問您的醫師或藥師。

## ☞ 服用方式

1. 通常一日 1 次，每次 0.5~1 粒
2. 服用藥物約 2 至 5 周便會逐漸出現療效，建議至少持續治療 6 個月以上，不宜自行停藥或改藥。

## ☞ 注意事項


1. 若您患有肝臟疾病，須經醫師評估是否適合使用。
2. 因 Naltrexone 有可能影響肝功能，若您在接受藥物治療的過程中，出現黃疸症狀，建議停用。使用高劑量 Naltrexone，可能會出現肝毒性，故急性肝炎或肝衰竭的病人，須避免使用 Naltrexone。
3. 定期監測有無憂鬱症狀或自殺意念。
4. 服藥期間，請勿併用含鴉片類藥物(包括含鴉片類藥物的咳嗽藥、感冒藥或止瀉劑等)。
5. 若您同時服用其他藥物，請告知醫師您所服用之藥物種類。

### (1) 酒精依賴：

若使用 Naltrexone 後仍持續飲酒 4-6 周，請向您的醫師反應，並建議停止使用藥物。

### (2) 鴉片類藥物依賴：

A. 使用 Naltrexone 前需停用鴉片類藥物 1-2 周以上，以避免加重戒斷症狀。



B. 若使用 Naltrexone 後，會降低鴉片類藥物之耐受性，若再度使用鴉片類藥物，更容易造成藥物過量，導致生命危險。

C. 若病患有使用鴉片類藥物/美沙東/丁基原啡因，使用 Naltrexone 可能會加速鴉片類藥物/美沙東/丁基原啡因之戒斷症狀，需注意使用。

6. 若您需進行手術治療(含牙科手術)，請告知醫師您正在服用 Naltrexone。
7. 服藥後副作用有噁心、難入睡、頭痛、焦慮等，當因副作用影響到服藥意願時，請儘速回診。
8. 若您已懷孕(或計畫懷孕)或在哺乳，請告知醫師並與醫師討論。
9. 健保並不給付本藥費用，故須自費。