



藥物成分	劑型	櫃號
<b>Pyridostigmine</b>	<b>口服藥</b>	

版本：TPE202309／檔號：2023-367

## ☞ 藥品商品名及含量

肌立健膜衣錠 60 毫克/錠 (Antilon F.C. Tablets)

美定隆糖衣錠 60 公絲/錠 (Mestinon S.C. Tablets)

## ☞ 藥品作用

治療重症肌無力。

## ☞ 服用方式

1. 每日 2~4 次，每次 1~3 粒。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是胃腸或泌尿道阻塞、氣喘、痙攣性氣管炎、心律不整、腎功能不佳。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是嗎啡類和巴比妥類藥物。
3. 常見副作用為噁心、嘔吐、腹瀉、唾液分泌增加、發汗、肌肉痙攣，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
4. 目前對胎兒的風險不明，由於臨床資料不足，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
5. 本藥可能會分泌到母乳裡，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。