



藥物成分	劑型	櫃號
Netupitant/ Palonosetron	口服藥	
版本：TPE202309／檔號：2023-680		

☞ 藥品商品名及含量

嘔可舒膠囊 300/0.5 毫克/膠囊 (Akynto)

☞ 藥品作用

預防化療引起的急性與噁心嘔吐。

☞ 服用方式

1. 第一天化療週期開始前一小時服用 1 次，每次 1 粒，飯前飯後皆可。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是血清素症候群。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是 Apomorphine、血清素作用劑。
3. 常見副作用為頭痛、虛弱、疲倦、便秘，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
4. 如果有下列症狀，請立刻就醫：過敏性休克、血清素症候群(情緒激動、幻覺、昏迷、心動過速、震顫、僵直、反射亢進、不協調)、癲癇。
5. 懷孕等級 C，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師，本藥分泌到母乳的量不明，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。