

藥物成分

劑型

櫃號

Flunarizine 2HCl

口服藥

版本：TPE202309 / 檔號：2023-213

## ☞ 藥品商品名及含量

復腦通膠囊 5 毫克/膠囊 (Flunazon)

舒腦膠囊 5 毫克/膠囊 (Suzin)

## ☞ 藥品作用

改善末梢血管循環障礙、噁心暈眩、迷路障礙、動暈症。

## ☞ 服用方式

1. 本藥通常每日服用 1 次，每次 1 粒。

2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是憂鬱症、帕金森氏症或其他錐體束外異常等疾病。

2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是安眠藥或鎮靜劑。

3. 請勿飲用酒類，酒精會增強此類藥物的鎮靜作用。

4. 本藥可能會讓人暈眩，在還沒確定對您有何影響前，請勿開車或操作危險機械。

5. 常見副作用為嗜睡、倦怠、食慾增加、體重增加、視力模糊，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。

6. 如果有下列症狀，請立即就醫：憂鬱、異常倦怠、錐體束外症狀(運動遲鈍、靜坐不能、顏面運動困難、顫抖等)。

7. 目前對胎兒的風險不明，但臨床資料不足，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。

8. 本藥分泌到母乳的量不明，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。