



藥物成分

劑型

櫃號

Lapatinib

口服藥

版本：TPE202309／檔號：2023-264

## ☞ 藥品商品名及含量

泰嘉膜衣錠 250 毫克/錠 (Tykerb)

## ☞ 藥品作用

乳癌治療

## ☞ 服用方式

1. 每日一次，每次 5 粒。
2. 應於進食前至少 1 小時或進食後至少 1 小時服用。
3. 請依醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。漏服的劑量不可再服，而應於下一個預訂的每日服藥時間重新開始服藥。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是肝功能不全、心臟疾病。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是 erythromycin、clarithromycin、ketoconazole、verapamil、cyclosporine、dexamethasone、phenytoin、carbamazepine、rifampin、phenobarbital、心律不整藥物等。
3. 服藥期間請避免吃葡萄柚或葡萄柚汁。
4. 常見副作用為腹瀉、噁心、嘔吐、紅疹、疲倦，以及手足症候群，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
5. 目前對胎兒的風險不明，但資料顯示動物實驗中有致畸胎的紀錄，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
6. 建議女性在治療期間與最後一劑後至少 5 天內停止哺乳。