



藥物成分

劑型

櫃號

Osimertinib

口服藥

版本：TPE202309／檔號：2023-329

☞ 藥品商品名及含量

泰格莎膜衣錠 80 毫克/錠 (Tagrisso Film Coated Tablets)

☞ 藥品作用

用於治療局部侵犯性或轉移性非小細胞肺癌。

☞ 服用方式

1. 每日 1 次，每次 1 粒。
2. 可與食物併服或不併服。
3. 需要整顆吞服。若有吞嚥困難，可將錠劑加入 4 湯匙(約 50 毫升)之非碳酸水中，攪拌直到錠劑崩散後立即喝下，過程中不可壓碎、加熱或以超音波震碎，再以 120-240 毫升水沖洗容器後立即喝下。
4. 若是使用鼻胃管給藥之病患，需先將錠劑崩散於 15 毫升非碳酸水中，另外以 15 毫升開水沖洗殘餘藥並移至灌食空針後，將藥品液體依鼻胃管使用說明進行給藥，再以適量開水沖洗管路。
5. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請勿補服錯過的劑量，請按照原服藥時間表服用下一劑。不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是肝腎功能及心臟節律異常之相關疾病。
2. 請告知醫師或藥師您是否有正在服用其他藥物，特別是強效的 CYP3A4 誘導劑，如 rifampicin、phenobarbital 等，或是會延長 QTc 間期的藥物，如 Fluroquinolone 類抗生素、其他精神疾病相關藥物等。
3. 常見副作用為腹瀉、噁心、嘔吐、口腔炎、食慾減低，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
4. 如果有下列症狀 請立刻就醫：眼部症狀(如眼睛感染、流

淚、對光敏感、眼睛疼痛、紅眼或視力改變)、心跳異常、心衰竭症狀(平躺時呼吸困難、水腫、心跳不規則)、肺炎感染，請立即連絡醫師。

5. 目前對胎兒的風險不明，但資料顯示動物實驗中有胚胎死亡和胎兒生長減緩的紀錄，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
6. 育齡期的婦女，應在治療期間及最後一次用藥後 6 週內採取有效避孕措施。男性應在治療期間及最後一次用藥後 4 個月內採取有效避孕措施。
7. 本藥分泌到母乳的量不明，在治療期間及最後一次用藥後 2 週內請勿哺乳。