

藥物成分

劑型

櫃號

**Chlorpheniramine
+ Platycodon
+ Polygala**

口服液

版本：TPE202309／檔號：2023-132

☞ 藥品商品名及含量

咳利寧液 chlorpheniramine maleate 0.4 毫克, platycodon Fl.Extract 0.012 毫升, polygala Fl. Extract 0.012 毫升/毫升 (Colin)

☞ 藥品作用

鎮咳、祛痰(由支氣管炎、咽喉頭炎等所引起之咳嗽及喀痰)。

☞ 服用方式

每日用量

1. 成人及 13 歲以上：每日 3-4 次，每次 5 毫升。
2. 6-12 歲：適用成人劑量之 1/2(一次 2.5 毫升)。
3. 未滿 6 歲：請洽醫師診治。

☞ 注意事項

1. 有下列情形者，請勿使用。
 - (1) 曾因本藥成分引起過敏的人。
 - (2) 有青光眼的人。
 - (3) 有前列腺肥大引起排尿困難的人。
2. 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師/藥師。
 - (1) 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
 - (2) 如與中樞神經抑制藥品、單胺氧化酶抑制劑(MAOI)併用或攝取酒精時，會增強抗膽鹼(Anticholinergic)作用，故應諮詢後小心投藥或減量。
3. 其他使用上注意事項
 - (1) 為防止兒童誤食請妥善保管。
 - (2) 避免陽光直射。

臺北市立

(3) 勿超過建議使用量。

(4) 使用前需振搖均勻，並使用所附量器量取藥量。

(5) 使用本藥會引起睡意，所以服用時應注意不可駕車或從事具危險性之機械操作工作。

4. 服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並諮詢醫師或藥師：發疹、多尿、排尿困難、神經過敏、頭痛、焦躁感、複視、嗜睡、口渴、胸悶、血小板減少、無顆粒球症、再生不良貧血。

☞ 藥品儲存

請貯存於 25°C 以下乾燥處。