



藥物成分

劑型

櫃號

Imipramine

口服藥

版本：TPE202309 / 檔號：2023-238

☞ 藥品商品名及含量

妥富腦糖衣錠 25 毫克/錠 (Tofranil)

益伊神糖衣錠 25 毫克/錠 (Imimine)

☞ 藥品作用

治療或改善憂鬱症或夜尿。

☞ 服用方式

1. 通常是睡前服用 1 次，或一日服用多次，請小心遵照處方箋指示用藥，若對此藥有任何疑問，應詢問醫師或藥師。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數，未經醫師指示不可自行停藥。
3. 若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是心肌梗塞危急者、青光眼、攝護腺肥大、排尿困難、驚懼發作、甲狀腺功能過高；或肝、腎疾病；糖尿病、癲癇、腸胃炎、胃部問題、視力問題，心臟血管疾病或有中風的病史。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是抗憂鬱藥 MAO 抑制劑該類藥品、safinamide、cimetidine、fluoxetine、carbamazepine、guanethidine、quinidine、擬交感神經作用藥及中樞神經抑制劑。
3. 本藥可能會讓人暈眩，在還沒確定對您有何影響前，請勿開車或操作危險機械。
4. 常見副作用為擾亂食慾、昏睡、虛弱或倦怠、興奮或焦慮、失眠、惡夢、口乾、皮膚對陽光較敏感、食慾和體重改變，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。

臺北市立

5. 若你有下列任一症狀的經驗，請立刻告訴您的醫師：(1) 頷、頸、和背肌肉痙攣；(2)說話遲緩或困難；(3)走路曳足；(4)持續纖細的振顫，靜坐不能；(5)發燒；(6)呼吸或吞嚥困難；(7)嚴重的皮膚發疹；(8)皮膚或眼睛發黃；(9)不規則的心搏。

6. 懷孕等級 D，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。

7. 本藥可能會分泌到母乳裡，服藥期間不建議哺乳。