

藥物成分

劑型

櫃號

Acitretin

口服藥

版本：TPE202309／櫃號：2023-007

## ☞ 藥品商品名及含量

新定康癬膠囊 25 毫克/膠囊 (Neotigason)

## ☞ 藥品作用

可促使表皮細胞的增生、分化及角質變性正常化，用於治療嚴重性牛皮癬、皮膚角化症。

## ☞ 服用方式

1. 起始劑量通常為每日 1 次，每次 1 粒；維持劑量通常為每日 1 次，每次 1~2 粒。
2. 建議與食物或牛奶一起服用。
3. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是嚴重肝腎功能受損、高血脂。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是 tetracycline 類藥物、methotrexate、etretinate、維生素 A 或其他 retinoids。
3. 停止期間及治療後 2 個月內，育齡婦女應避免服用酒精。
4. 治療期間與完成治療的 3 年內禁止捐血。
5. 本藥可能會讓夜間視力降低，在夜間駕駛或操作任何交通工具時應注意。
6. 服藥期間，請定期監控肝功能、血糖、血脂肪相關指數，兒童使用應監測生長指標及骨頭發育情形。
7. 常見副作用為嘴唇乾澀、脫髮、皮膚脫屑、搔癢、指甲易脆、流鼻血、鼻炎、眼睛乾澀，但一般的不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。

8. 如果有下列症狀，請立刻就醫：顱內高血壓(嚴重頭痛)、噁心、嘔吐、視覺障礙。
9. 本藥具有高度致畸胎性，懷孕期間禁止使用，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師，並建議於開始使用前兩週內以及使用期間每個月進行驗孕。
10. 育齡婦女在開始用藥前四周、用藥期間、停止治療後三年需採取有效且不間斷的避孕措施。
11. 本藥可能會分泌到母乳裡，服藥期間不建議哺乳。